

## CORTINARIUS

### Subgenus Cortinarius

- bataillei* (Favre 1960 ex Moser 1976) Høiland (Der.)  
*callisteus* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Lep.)  
*cinnamomeus* (L. 1753 : Fr. 1821) Gray 1821 (Der.)  
*cotoneus* Fr. 1838 (Lep.) „U“  
*crassus* Fr. 1838 (Phl.)  
*croceoconus* Fr. 1851 (Der.)  
*croceus* (Schaeffer 1774) Bigeard et Guillemain (Der.)  
*fervidus* Orton 1964 (Der.)  
*gentilis* (Fr. 1821) Fr. 1838 (Lep.)  
*huronensis* Ammirati et Smith (Der.)  
*limonius* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Lep.)  
*malicorius* Fr. 1838 (Der.)  
*raphanoides* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Lep.)  
*rubellus* Cooke 1887 (Lep.)  
*rubicundulus* (Rea 1893) Maire (Lep.) „U“  
*sanguineus* (Wulfen 1788 : Fr. 1821) Gray 1821 (Der.)  
*semisanguineus* (Fr. 1821) Gillet 1874 (Der.)  
*silvae-norvegicae* Høil.  
*sommerfeltii* Høiland 1984 (Der.)  
*tubarius* Ammirati et Smith (Der.)  
*uliginosus* Berkeley 1860 (Der.)  
*uliginosus* Berk. f. *luteus* (Gabriel et Lamoure) Høiland  
*valgus* Fr. 1838 (Lep.)  
*vespertinus* (Fr. 1821) Fr. 1836 (Phl.)  
*violaceus* (L. 1753 : Fr. 1821) Gray 1821  
 subsp. *violaceus* „U“  
 subsp. *hercynicus* (Pers. 1801) Brandr.
- Orangefüßiger H.  
 Rhabarberfüßiger R.  
 Zimt-H.  
 Olivbrauner R.  
 Trockener Sk.  
 Safrankegeliger H.  
 Safranblättriger H.  
 Rostblättriger H.  
 Goldgelber R.  
 Sumpf-H.  
 Löwengelber R.  
 Orangerandiger H.  
 Rettich-R.  
 Spitzgebuckelter R.  
 Gilbender R.  
 Blutroter H.  
 Blutblättriger H.  
 Norvegenwälder Sch.  
 Orangeblättriger H.  
 Sumpfmooß-H.  
 Moor-H.  
 Zierlicher Moor-H.  
 Kahler R.  
 Orangeblasser Sk.
- Dunkelvioletter D.  
 Dunkelvioletter D.

### Subgenus Telamonia

- acutus* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Tel.)  
*agathosmus* Brandrud, Lindström et Melot 1989 (Tel.)  
*alboviolaceus* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Ser.)  
*angelesianus* Smith 1944  
*anomalus* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Ser.)  
*armillatus* (Fr. 1814 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Tel.)  
*armeniacus* (Schaeffer : Fr. 1821) Fr. 1838 (Tel.)  
*atrocoeruleus* (Moser) Moser (Tel.)  
*badiovinaceus* Moser 1965 (Tel.)  
*balaustinus* Fr. 1838 (Tel.)  
*bibulus* Quélet 1881 (Tel.)  
*biformis* Fr. 1838 (Tel.)  
*bolaris* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Lep.) „U“  
*brunneogriseus*  
*brunneus* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Tel.)  
 var. *brunneus*  
 var. *clarobrunneus*
- Spitzer W.  
 Duft-G.  
 Weißvioletter D.  
 Strubbeliger G.  
 Graubräunlicher D.  
 Geschmückter G.  
 Aprikosen-W.  
 Mehrfarbiger W.  
 Weinbrauner W.  
 Feuerblättriger W.  
 Violetter Erlen-W.  
 Schrägberingter G.  
 Rotschuppiger R.  
*Braungrauer* G.
- Dunkelbrauner G.  
 Lichtbrauner G.

var. glandicolor  
 cagei Melot 1990 „U“  
 camphoratus (Fr. : Fr. 1821) Fr. 1838 (Ser.)  
 canabarba Moser 1966 (Tel.)  
 cinnabarinus Fr. 1838 (Tel.) „U“  
 comptulus Moser 1967 (Tel.)  
 cyanites Fr. 1838 (Ser.)  
 decipiens (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Tel.)  
 decoloratus (Fr.) Fr. (Ser.) (f.)  
 dolabratus Fr. 1838 (Tel.)  
 duracinus Fr. 1838 (Tel.)  
 erubescens Moser 1968 (Tel.)  
 evernius (Fr. 1818 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Tel.)  
 flexipes (Pers. : Fr. 1821 ) Fr. 1838 (Tel.)  
 var. flexipes  
 var. flabellus (Fr.:Fr.9 Lindstr. et Melot  
 flos-paludis Melot 1980

Eichelfarbener G.  
 Zweifarbiger W.  
 Bocks-D.  
 Wolfs-G.  
 Zinnoberroter Buchen-G.  
 Haarschüppchen-W.  
 Rötender D.  
 Schwarzgebuckelter W.  
 Entfärbender D.  
 Durchwässerter G.  
 Spindeliger W.  
 Kastanienbrauner W.  
 Rettich-G.  
 Violettlicher G.  
 Pelargonien G.  
 Schlankstieliger G.

. limacella“  
 butus Fr. 1838 (Myx.)  
 inctus Fr. 1838 (Myx.)  
 godelibutus Henry 1985 (Myx.)  
 lo-ochraceus (Berkeley 1836) Berkeley 1860 (Myx.)  
 rospermus Lange 1940 (Myx.)  
 osus (Bulliard 1792 : Fr. 1821) Kickx 1867 (Myx.)  
 entrionalis Bendiksen et Brandrud 1992 (Myx.)  
 atitius Fr. 1838 (Myx.)  
 atilis (Fr. 1821) Fr. 1838 (Myx.)

## enus Phlegmacium

eatoalbus R.Hry 1985 „U“  
 eatotomentosus Henry ex Henry 1985 (Phl.) „U“  
 eatus (Fr. 1818) Fr. 1838 (Phl.)  
 sjoensis Brandrud 1992 (Phl.)  
 icolor (Fr. 1818) Fr. (Phl.)  
 icolor (Fr. 1818) Fr. (Phl.)  
 „lapponicus“  
 atilis Fr. 1838 (Phl.) „U“  
 ensis  
 ictus (Fr. : Fr. 1821) Fr. 1838 (Phl.)  
 iformis (Fr.) Fr. 1838 (Phl.)  
 landicus Brandrud 1989 (Phl.)  
 ilis Brandrud et Melot 1983 (Phl.)  
 omis Fr. 1838 (Phl.) „U“  
 philus  
 hyropus (Albertini et Schweiniz 1805) Fr. 1838 (Phl.)  
 eri (Weinmann 1836) Fr. 1838 (Phl.)  
 ius (Fr. : Fr. 1821) Fr. 1836 (Phl.)  
 rus (Fr. 1818 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Phl.)  
 scaurus  
 erpeticus (Fr. 1838) Quélet  
 phagnophilus (Peck 1878) Brandrud  
 ius Fr. 1838 (Phl.)  
 rtus (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Phl.)  
 alis Fr. 1838 (Phl.) „U“  
 color (Pers. 1801 : Fr. 1821) Fr. 1838 (Phl.)

Pigmentloser Sf.  
 Violettblättriger Sf.  
 Stahlblauer Sf.  
 Zweifelhafter Sf.  
 Langstieliger Sf.  
 Kleinsporiger Sf.  
 Heide-Sf.  
 Nördlicher Sf.  
 Honig-Sf.  
 Galliger Sf.

Puderstieliger Sk.  
 Violettrandiger Sk.  
 Violettgebänderter Sk.  
 Weißgestiefelter Sk.  
 Weißgestiefelter Sk.

Taubenblauer Sk.

Bitterer Sk.  
 Sägeblättriger K.  
 Norrländischer Sk.  
 Braunfleckiger Sk.  
 Würziger Sk.

Purpurfüßiger Sk.  
 Lilastieliger Sk.  
 Geschmückter Sk.

Olivblättriger K.  
 Großer Olivblättriger K.  
 Peck's Moor-K.  
 Seidiger Sk.  
 Olivgelber Weihrauch-Sk.  
 Rasiger Sk.  
 Erdigriechender Sk.