

Fundliste der *Cortinarius*-Arten bei der 37. J.E.C.-Cortinariantagung in Brennabu, Valdres, Norwegen 2019

Tabelle. *Cortinarius*-Arten der J.E.C.-Cortinariantagung in Valdres, Norwegen, vom 11.-17. August 2019.
Arten, die in einer eigenen Arbeit in diesem Heft näher besprochen werden, in Fettdruck.

Subgen. <i>Phlegmacium</i> (20 sp.)	<i>C. vibratilis</i> coll.	<i>C. glandicolor</i>
<i>C. badiolatus</i> (= <i>C. durus</i> s. auct.)	Subgen. <i>Dermocybe</i> (8 spp.)	<i>C. aff. helvolus</i>
<i>C. balteatus</i>	<i>C. bataillei</i>	<i>C. helobius</i> coll.
<i>C. borgsjoeënsis</i>	<i>C. cinnamomeus</i>	<i>C. hinnuleus</i> coll.
<i>C. caesiophylloides</i>	<i>C. croceus</i>	<i>C. illuminus</i>
<i>C. claricolor</i>	<i>C. fervidus</i>	<i>C. aff. illuminus</i>
<i>C. fulvoochrascens</i>	<i>C. huronensis</i> (= <i>C. chrysolithus</i>)	<i>C. aff. inolens</i>
<i>C. infractiflavus</i>	<i>C. malicorius</i>	<i>C. ionophyllus</i>
<i>C. multiformis</i>	<i>C. sanguineus</i>	<i>C. laniger</i>
<i>C. pallidopercomis</i> (ined.)	<i>C. sommerfeltii</i>	<i>C. luteo-ornatus</i>
<i>C. patibilis</i>	Subgen. <i>Telamonia</i> (49 sp.)	<i>C. malachius</i>
<i>C. percomis</i>	<i>C. acutus</i>	<i>C. mattiae</i> (= <i>C. imbutus</i> p.p.)
<i>C. porphyropus</i>	<i>C. agathosmus</i>	<i>C. melleopallens</i>
<i>C. pseudonaeovosus</i> (= <i>C. acidophilus</i>)	<i>C. alboviolaceus</i>	<i>C. obtusus</i> coll.
<i>C. riederi</i>	<i>C. andreae</i>	<i>C. paragaudis</i>
<i>C. rosargutus</i>	<i>C. armillatus</i>	<i>C. piceidisjungendus</i>
<i>C. scaurus</i>	<i>C. aureovelatus</i>	<i>C. raphanoides</i>
<i>C. sphagnophilus</i>	<i>C. badiovinaceus</i>	<i>C. rusticus</i>
<i>C. squameopercomis</i> (ined.)	<i>C. bivelus</i>	<i>C. saniosus</i>
<i>C. talus</i>	<i>C. boreasensis</i> (= <i>C. ionosmus</i>)	<i>C. saturninus</i> (= <i>C. subtorvus</i>)
<i>C. violaceonitens</i> (<i>C. herpeticus</i> coll.)	<i>C. brunneus</i>	<i>C. solis-occasus</i>
Subgen. <i>Myxacium</i> (15 sp.)	<i>C. camphoratus</i>	<i>C. traganus</i>
<i>C. alpinus</i>	<i>C. cf. cicindela</i>	<i>C. venustus</i>
<i>C. betulinus</i>	<i>C. colymbadinus</i>	<i>C. valgus</i>
<i>C. causticus</i>	<i>C. cf. comatus</i>	Andere Gruppen (<i>Leprocybe</i>, <i>Anomali</i>, etc.) (9 sp.)
<i>C. collinitus</i>	<i>C. comptulus</i>	<i>C. anomalus</i> coll.
<i>C. delibutus</i>	<i>C. decipiens</i>	<i>C. cf. boreicyanites</i>
<i>C. delibutus</i> var. <i>parvulus</i>	<i>C. depressus</i>	<i>C. infucatus</i> (= <i>C. citrinofulvescens</i>)
<i>C. emunctus</i>	<i>C. dolabratus</i>	<i>C. limonius</i>
<i>C. fennoscandicus</i>	<i>C. duracinus</i> coll.	<i>C. lepidopus</i>
<i>C. pluvius</i>	<i>C. ectypus</i>	<i>C. neocallisteus</i>
<i>C. septentrionalis</i>	<i>C. erubescens</i>	<i>C. rubellus</i>
<i>C. stillatitius</i>	<i>C. evernius</i>	<i>C. tabularis</i>
<i>C. subtortus</i>	<i>C. flabellus</i>	<i>C. violaceus</i>
<i>C. transiens</i>	<i>C. flexipes</i>	
<i>C. trivialis</i>	<i>C. gentilis</i>	